

EDIZIONE 2019

GUIDA ALLA SALUTE DEL TUO GATTO

GUIDA ALLA SALUTE DEL TUO GATTO

Tutto quello che avresti sempre dovuto sapere

EBOOK
Edizione 2019



DI COSA PARLEREMO

Indice

- Importanza della cura veterinaria
- Segni di malattia
- Somministrare Farmaci
- Vaccinazioni
- Controllo Parassiti
- Parassiti Comuni Nei Gatti
- Cure odontoiatriche
- Pulizia del Gatto
- Pericoli Domestici
- La Sterilizzazione/Castrazione

L'assistenza sanitaria di routine si riferisce all'assistenza generale non di emergenza necessaria per mantenere il tuo gatto in buona salute per tutta la sua vita.

Ciò include l'assistenza veterinaria di routine per le vaccinazioni, il controllo dei parassiti e le cure dentistiche; nutrizione appropriata; governare; e protezione dai rischi domestici.

IMPORTANZA DELLA CURA VETERINARIA



I gatti adulti devono sottoporsi ad un esame veterinario completo almeno una volta all'anno. I gattini hanno bisogno di visite veterinarie di solito ogni 3-4 settimane fino a quando non hanno circa 4 mesi.

I gatti geriatrici (di età superiore a 8-9 anni) dovrebbero vedere il loro veterinario due volte l'anno o più frequentemente perché la malattia è più comune negli animali domestici anziani e dovrebbe essere identificata prima per fornire un trattamento adeguato.

Il veterinario può raccomandare un programma di benessere per il vostro animale domestico, come esami del sangue di routine per monitorare la diagnosi precoce di reni o di fegato.

SEGNI DI MALATTIA



Poiché hai più familiarità con il tuo gatto che con chiunque altro, dovresti guardarlo attentamente per i sottili segni di malattia che potrebbero mancare alla vista di un'altra persona o anche a un veterinario. I segni generali di malattia includono mancanza di appetito o diminuzione dell'attività.

Altri segni più specifici includono vomito e diarrea, urinare più (o meno) di frequente, tosse e starnuti o la formazione di molti muchi agli occhi, dalle orecchie o dal naso.

La malattia può anche presentarsi come una perdita di peli o aree pruriginose sulla pelle o intorno alle orecchie. I problemi con il sistema muscolo-scheletrico sono spesso visti come rigidità o zoppia, come mettere il peso su una gamba. Se il tuo gatto mostra uno di questi segni per più di un giorno o due, una visita con il tuo veterinario è una buona idea.

SOMMINISTRARE FARMACI



Somministrare pillole a un gatto può essere una sfida. Alcuni gatti prenderanno una pillola che è nascosta in una piccola sorpresa, come un pezzo di tonno o pollo. Tuttavia, molti gatti mangeranno l'involucro e sputeranno il farmaco.

In questi casi, dovrai imparare come dare una pillola inclinando la testa del gatto in modo che lui o lei stia guardando verso l'alto (cioè al soffitto), aprendo la bocca e posizionando la pillola direttamente nella parte posteriore del bocca per deglutire. Il tuo veterinario o tecnico veterinario può darti una dimostrazione e una guida aggiuntiva.


A volte vengono prescritti farmaci liquidi, in particolare per i gattini. I liquidi possono essere somministrati tramite una siringa nella parte posteriore della bocca del gatto inserendo la punta della siringa vicino ai denti posteriori su entrambi i lati.

Tenendo la testa del gatto rivolta verso l'alto parzialmente può aiutare a prevenire fuoriuscite.

I prodotti spot-on o altri farmaci topici vengono somministrati direttamente sul pelo o sulla pelle. Se il tuo gatto ha bisogno di collirio o di un farmaco per l'orecchio, il tuo veterinario o veterinario ti darà una dimostrazione.

Indipendentemente dal tipo di farmaco o da come deve essere somministrato, è importante leggere e seguire tutte le istruzioni riportate sull'etichetta. Ottenere un gatto per prendere una pillola può essere una sfida.

VACCINAZIONI



La vaccinazione è un componente chiave della medicina preventiva nei gatti, proprio come nei cani e nelle persone. Vaccinazioni vengono somministrate per stimolare il sistema immunitario contro le infezioni prima dell'esposizione alla malattia. Diversi vaccini vengono somministrati di routine ai gatti come difesa principale contro gravi malattie infettive (ad esempio, panleucopenia, herpesvirus).

Molti altri sono importanti in alcune regioni e situazioni (ad esempio, il virus della leucemia felina o FELV). Il veterinario può consigliare quali vaccini sono raccomandati nella zona e nelle circostanze locali.

Tradizionalmente, **le vaccinazioni di richiamo** sono state fatte ogni anno durante la vita del gatto per garantire una protezione continua. Tuttavia, la necessità di una rivaccinazione annuale è stata messa in discussione negli ultimi anni.

Alcuni dati indicano che, dopo il primo anno di vita, l'immunità dura abbastanza a lungo in modo che le vaccinazioni di richiamo siano necessarie solo ogni pochi anni.

Inoltre, alcune ricerche hanno suggerito che l'infiammazione locale, anche quella associata a **determinati tipi di vaccini, può portare al fibrosarcoma nei gatti**, che è il più comune tumore del tessuto molle di questa specie.

I vaccini che usano il virus della leucemia felina ucciso e i vaccini antirabbici sono più comunemente associati a questa forma di cancro. Il dibattito sul miglior approccio alla vaccinazione è in corso. Il tuo veterinario può consigliarti sul miglior programma di vaccinazione per il tuo gatto.

CONTROLLO PARASSITI



Parecchi parassiti interni ed esterni possono infettare i gatti. I parassiti intestinali comuni dei gatti includono nematodi, anchilostomi e tenie. Le infezioni da vermi vengono spesso passate attraverso le uova nelle feci o direttamente dalla madre alla prole attraverso la placenta o il latte.

A volte, un ospite secondario è coinvolto con l'infezione. Ad esempio, le infezioni da tenia sono passate attraverso l'ingestione di larve nelle pulci o nei tessuti di prede infette (come i topi).

I vermi intestinali causano danni al tratto digestivo e alla perdita di sangue.

Inoltre interferiscono con l'assorbimento dei nutrienti essenziali. L'infezione viene diagnosticata trovando uova di verme (o talvolta vermi effettivi o segmenti di verme) in campioni fecali. I campioni di feci devono essere testati più volte nei gattini, periodicamente (di solito ogni anno) in tutti i gatti indoor e almeno due volte all'anno in gatti all'aperto, che sono particolarmente suscettibili di contrarre i parassiti.

I vermi intestinali dei gatti di solito non causano infezioni intestinali nelle persone; tuttavia, le infezioni da anchilostoma che portano a dolore addominale e enterite si sono sviluppate in persone con un sistema immunitario indebolito.

Le larve di nematodi hanno anche il potenziale di infettare le persone; le larve ingerite possono vagare in organi sensibili, come l'occhio o in un feto in via di sviluppo. I proprietari di gatti devono pulire frequentemente tutti i cestini dei rifiuti (occorrono almeno una settimana affinché queste uova intestinali del parassita diventino infettive) e lavarsi accuratamente le mani dopo ogni esposizione alla lettiera, alle feci, al vomito e ad altri liquidi corporei.

CONTROLLO PARASSITI INTERNI



Parecchi parassiti interni ed esterni possono infettare i gatti. I parassiti intestinali comuni dei gatti includono nematodi, anchilostomi e tenie. Le infezioni da vermi vengono spesso passate attraverso le uova nelle feci o direttamente dalla madre alla prole attraverso la placenta o il latte.

A volte, un ospite secondario è coinvolto con l'infezione. Ad esempio, le infezioni da tenia sono passate attraverso l'ingestione di larve nelle pulci o nei tessuti di prede infette (come i topi).

I vermi intestinali causano danni al tratto digestivo e alla perdita di sangue.

Inoltre interferiscono con l'assorbimento dei nutrienti essenziali. L'infezione viene diagnosticata trovando uova di verme (o talvolta vermi effettivi o segmenti di verme) in campioni fecali. I campioni di feci devono essere testati più volte nei gattini, periodicamente (di solito ogni anno) in tutti i gatti indoor e almeno due volte all'anno in gatti all'aperto, che sono particolarmente suscettibili di contrarre i parassiti.

I vermi intestinali dei gatti di solito non causano infezioni intestinali nelle persone; tuttavia, le infezioni da anchilostoma che portano a dolore addominale e enterite si sono sviluppate in persone con un sistema immunitario indebolito.

Le larve di nematodi hanno anche il potenziale di infettare le persone; le larve ingerite possono vagare in organi sensibili, come l'occhio o in un feto in via di sviluppo. I proprietari di gatti devono pulire frequentemente tutti i cestini dei rifiuti (occorrono almeno una settimana affinché queste uova intestinali del parassita diventino infettive) e lavarsi accuratamente le mani dopo ogni esposizione alla lettiera, alle feci, al vomito e ad altri liquidi corporei.

CONTROLLO PARASSITI ESTERNI



I gatti possono anche essere infettati da protozoi, come coccidi o toxoplasma. Questi sono parassiti microscopici che vivono all'interno delle cellule del tubo digerente. Di grande preoccupazione per i proprietari di gatti è la toxoplasmosi, che viene trasmessa direttamente attraverso le uova o indirettamente attraverso le cisti infettive nella carne cruda (di solito da animali da preda).


La **toxoplasmosi** di solito causa solo un leggero disturbo digestivo nei gatti, ma può causare una malattia più grave se trasmessa alle persone.

Le persone particolarmente a rischio includono le donne incinte, i bambini piccoli e coloro che hanno un sistema immunitario indebolito, come le persone con AIDS o coloro che ricevono la chemioterapia per il cancro. Gli organismi ingeriti possono migrare in tutto il corpo, causando danni a organi importanti (incluso il cervello) o a un feto in via di sviluppo.

Le persone a rischio possono prevenire l'infezione non trattando le feci di gatto e non mangiando carne rara o sottodimensionata. La pulizia della lettiera dei gatti dovrebbe essere fatta da qualcun altro.

Altri parassiti interni dei gatti includono la febbre (flatworms che può infettare l'intestino o il fegato) e i vermi dell'unghia. I gatti esterni che cacciano sono inclini a queste infezioni, specialmente se vivono o cacciano vicino all'acqua. Gli animali acquatici come le lumache e le rane sono ospiti comuni per le larve di trematode o linfibio in via di sviluppo.

CONTROLLO PARASSITI ESTERNI



Queste infezioni vengono diagnosticate testando campioni fecali.

I gatti possono anche essere infettati da dirofilarie, che sono parassiti trasmessi dalle zanzare. La filaria cardiopolmonare è comune nella maggior parte degli Stati Uniti. È più comunemente diagnosticato con un esame del sangue e può essere prevenuto con la somministrazione di farmaci mensili.

Non esiste un trattamento efficace per l'infezione da filaria nei gatti, quindi la prevenzione è fondamentale.

Parassiti esterni dei gatti includono pulci, zecche, acari della rogna e acari dell'orecchio. Sono disponibili trattamenti preventivi mensili per controllare le pulci e le zecche e vengono somministrati come spray per il corpo o preparati "a macchia di topa" che vengono posizionati sulla pelle tra le scapole.

Gli acari della rogna possono essere rilevati raschiando la pelle delle aree infette per i segni degli acari o delle loro uova. Segni di rogna includono aree rosse, squamose o zone calve sulla pelle, o entrambi. Un tipo di rogna chiamata Cheyletiella è chiamata "forfora che cammina".

Questo grande acaro provoca prurito lungo la superficie della pelle, mentre altri acari della rogna risiedono più all'interno degli strati della pelle o dei follicoli piliferi. Le persone possono anche essere infestate dagli acari della rogna scavatrice (Sarcoptes) e dalla Cheyletiella .

CONTROLLO PARASSITI ESTERNI



I graffi frequenti possono essere un segno di infestazione da pulci o altri parassiti.

I gatti esterni possono anche essere infestati da una larva di Cuterebra , che è una fase di sviluppo di una particolare mosca.

Le larve si trovano comunemente intorno ai fori dei roditori e dei conigli e si insinuano sotto la pelle dei gatti. Ciò si traduce in un forte gonfiore sotto la pelle, solitamente intorno alla zona della testa o del collo, con un piccolo foro rotondo sulla superficie della pelle.

Il trattamento consiste nella rimozione della larva e nel trattamento della ferita risultante.

CURE ODONTOIATRICHE



I gatti hanno bisogno di cure dentistiche per tutta la vita.

Puoi aiutare a mantenere i denti e le gengive del tuo gatto in buone condizioni nutrendo cibo secco e seguendo un programma di pulizia dentale professionale eseguito dal veterinario.

Una buona cura dentale riduce lo sviluppo della placca che, se non trattata, può progredire a gengiviti e malattie gengivali. Nei casi gravi di malattia dentale, l'estrazione è comune.

PULIZIA DEL GATTO



Spesso i gatti si puliscono da soli. Le razze a pelo corto di solito richiedono pochi spazzolamenti o bagni dai loro proprietari. La spazzolatura di routine di gatti a pelo lungo, o di gatti che smettono di governare a causa di una malattia, è importante per rimuovere i peli del capello e prevenire le stuoie.

La spazzolatura limita anche la quantità di peli che i gatti ingeriscono, il che aiuta a ridurre lo sviluppo dei boli di pelo. Molti gatti amano essere spazzolati e il grooming può essere usato come ricompensa e tempo di legame. Le stuoie devono essere rimosse con forbici elettriche (non forbici) per evitare di tagliare la pelle sottostante.

Le orecchie del tuo gatto dovrebbero essere controllate regolarmente per la pulizia. Se sporczia e cera si accumulano nelle orecchie, possono ospitare organismi che possono causare infezioni. Il tuo veterinario può pulire le orecchie del tuo gatto in sicurezza. Se la pulizia è necessaria su base regolare, chiedere al veterinario per dimostrare come ciò dovrebbe essere fatto.

I gatti sani raramente hanno bisogno di fare il bagno. Tuttavia, se è necessaria la balneazione, devono essere utilizzati solo shampoo da compagnia approvati per l'uso sui gatti.

PULIZIA DEL GATTO



Spesso i gatti si puliscono da soli. Le razze a pelo corto di solito richiedono pochi spazzolamenti o bagni dai loro proprietari. La spazzolatura di routine di gatti a pelo lungo, o di gatti che smettono di governare a causa di una malattia, è importante per rimuovere i peli del capello e prevenire le stuoie.

La spazzolatura limita anche la quantità di peli che i gatti ingeriscono, il che aiuta a ridurre lo sviluppo dei boli di pelo. Molti gatti amano essere spazzolati e il grooming può essere usato come ricompensa e tempo di legame. Le stuoie devono essere rimosse con forbici elettriche (non forbici) per evitare di tagliare la pelle sottostante.

Le orecchie del tuo gatto dovrebbero essere controllate regolarmente per la pulizia. Se sporczia e cera si accumulano nelle orecchie, possono ospitare organismi che possono causare infezioni. Il tuo veterinario può pulire le orecchie del tuo gatto in sicurezza. Se la pulizia è necessaria su base regolare, chiedere al veterinario per dimostrare come ciò dovrebbe essere fatto.

I gatti sani raramente hanno bisogno di fare il bagno. Tuttavia, se è necessaria la balneazione, devono essere utilizzati solo shampoo da compagnia approvati per l'uso sui gatti.

PERICOLI DOMESTICI



Il tuo gatto deve essere protetto dai rischi domestici, inclusi prodotti chimici, pesticidi, prodotti per la pulizia, antigelo, cavi elettrici, droghe, alcol e piante domestiche comuni che **potrebbero essere velenose**. I gattini curiosi che tendono a masticare quasi tutto sono a maggior rischio e questi prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata di tutti i gatti.

I gatti sono particolarmente sensibili a molti farmaci comunemente trovati nella famiglia media, tra cui aspirina , paracetamolo , ibuprofene e rimedi contro il raffreddore. Non somministrare mai al tuo gatto alcun farmaco umano se non specificamente indicato dal tuo veterinario.

Gatti e gattini dovrebbero essere tenuti lontano da finestre aperte o balconi in appartamenti o condomini che sono più piani sopra la terra. Sebbene siano agili e spesso in grado di raddrizzarsi a mezz'aria, i gatti possono comunque subire gravi lesioni se cadono da una grande altezza.

STERILIZZAZIONE - CASTRAZIONE



Tutti i gatti devono essere sterilizzati (femmine) o castrati (maschi) a meno che non vengano utilizzati per la riproduzione. Questo previene gattini indesiderati ed evita potenziali problemi medici futuri, come il cancro o l'infezione uterina.

La sterilizzazione o la castrazione diminuiscono anche la voglia di girovagare all'esterno, il che può causare incidenti d'auto, lotte e altre lesioni.

Anche i gatti maschi castrati hanno meno probabilità di spruzzare l'urina per contrassegnare il loro territorio. La procedura viene solitamente eseguita quando i gatti hanno dai 6 ai 7 mesi.

GRAZIE PER AVER SCARICATO QUESTA GUIDA

